
U.S. WHEAT ASSOCIATES
Dependable People. Reliable Wheat.

Informe Semanal de la Cosecha – 08 julio, 2026

La cosecha de HRW avanza en nueve estados, con datos de 348 muestras incluidos en el informe de esta semana. La cosecha de SRW progresa de manera constante y tiene un 80% de avance. En el PNW continúa el clima cálido y seco al comenzar la cosecha de SW de invierno. La cosecha de HRS y Northern Durum siguen avanzando a un ritmo superior al promedio.



HARD RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de HRW en EE. UU. tiene un 66% de avance, muy por delante del promedio, mientras continúa avanzando hacia el norte a través de las Planicies centrales. La cosecha está casi terminada en Texas, Oklahoma y Kansas, aunque los campos restantes se han retrasado debido a las lluvias recientes. Colorado tiene un 53% de avance y se espera que finalice pronto. Representantes estatales informan que Nebraska tiene un 33% de avance. La cosecha apenas comienza en las zonas del norte, incluyendo South Dakota, Idaho, Washington y Oregon, con cortes de prueba en Wyoming.

Condiciones del cultivo: Las condiciones de HRW siguen siendo variables tras una temporada de cultivo difícil. En las Planicies del sur y centrales, las lluvias excesivas han repuesto la humedad del suelo, pero han reducido el potencial de rendimiento, aumentado el abandono de cultivos y retrasado la cosecha. Los informes estatales indican una amplia variabilidad en el rendimiento, y el abandono de cultivos sigue siendo una característica importante de la cosecha de HRW del 2026, con porcentajes que oscilan entre el 20% y el 71%. El abandono general de los campos de HRW se estima actualmente en un 29%. A pesar de esto, las características del grano se mantienen, con peso específico aceptable y, en general, mayor contenido de proteína, aunque en las zonas de cosecha temprana se han reportado niveles de proteína más bajos. Los molinos nacionales observan variabilidad y menores pesos de 1000 granos, pero la funcionalidad general parece buena. En contraste, el Noroeste Pacífico (PNW) presenta condiciones más favorables, con buenos rendimientos tempranos, peso específico elevado y buen contenido de proteína en Oregon, además de condiciones generalmente favorables en Washington e Idaho.

Datos de trigo: Los datos de HRW de esta semana incluyen 348 muestras de Texas, Oklahoma, Kansas, Colorado y Nebraska, lo que representa el 58% de las muestras esperadas. El peso específico promedia 60.3 lb/bu (79.3 kg/hl), con un promedio de proteína del 12.4% (12% bh). El peso de mil granos es menor que el del año pasado, con un promedio de 28.4 g. El *falling number* promedio de 353 segundos, indica una cosecha generalmente buena hasta la fecha.

Datos de harina: Las pruebas iniciales de composición incluyen 12 muestras, con promedios ponderados de 70.8% de rendimiento de harina, 11.1 % de proteína de harina (14% bh), 30.3 % de gluten húmedo y 59.3% de absorción farinográfica. El volumen promedio de horneado es de 857 cc, con un mayor volumen en las muestras compuestas con alto contenido de proteína.

Clima: Las condiciones cálidas y secas favorecen el rápido avance de la cosecha en las Grandes Llanuras, mientras que las lluvias dispersas podrían ralentizar brevemente la actividad en las zonas del norte. El PNW permanece cálido y seco.

DATOS DEL TRIGO	FACTORES DE GRADO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	*Dockage* %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
Esta Semana	348	600	11.5	12.4	14.0	0.4	28.4	353	2 HRW	60.3	79.3	0.1	0.5	1.0	1.6
Semana Pasada	299	500	11.5	12.3	14.0	0.4	28.4	353		60.2	79.2				
2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370	1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362	1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de SRW en EE. UU. tiene un 78% de avance a pesar de las precipitaciones dispersas en la región. La cosecha está finalizando en los estados del sur y avanza en el Medio Oeste y la región del Atlántico Medio, con más de la mitad completada en varios estados y un 44% en Ohio.

Condiciones del cultivo: Las condiciones de la cosecha de SRW se mantienen generalmente estables, gracias a las abundantes lluvias primaverales y las calificaciones del USDA varían entre un 37% y un 75% de bueno a excelente. La humedad favorable mejoró el potencial de rendimiento, pero las lluvias durante la cosecha han reducido el *falling number* y el peso específico en algunas áreas, particularmente en regiones que experimentaron eventos de precipitación repetidos. Esta tendencia pone de manifiesto los riesgos emergentes para la calidad, incluso cuando las perspectivas generales de rendimiento se mantienen sólidas.

Presión por enfermedades/plagas: Las condiciones húmedas han aumentado el riesgo de enfermedades en algunas áreas, aunque los impactos siguen siendo limitados y se están monitoreando.

Datos: Actualmente hay 127 muestras de SRW en el laboratorio, aproximadamente el 44% de las muestras esperadas. El peso específico promedia 60.1 lb/bu, por encima de los promedios de 2025 y 2024. Las características del grano se ven robustas, con un peso promedio de 1000 granos de 33.9 g, superior a los 32.9 g de 2025 y a los 32.7 g de 2024. El 51% de las muestras pesan 34 g o más, y solo el 7% pesan menos de 30 g. El contenido proteico promedio es del 10.2% con un 12% de materia seca, superior al 9.3% de 2025. El *falling number* promedio es de 307 segundos, con un 39% de las muestras en 325 segundos o más. La humedad promedio es del 13.0%, con un 57% de las muestras en 13% o más.

Clima: El calor y la humedad extremos recientes, combinados con lluvias repetidas, han ralentizado la cosecha y generado preocupación por la calidad, aunque se esperan temperaturas más propias de la estación.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	127	250	13.0	10.2	11.6	0.6	33.9	307
Semana Pasada	114	250	13.0	10.3	11.8		33.9	310
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	60.1	79.1	0.3	0.4	0.6	1.3
	60.3	79.3				
2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

Progreso de la cosecha: La Cosecha de trigo SW de invierno está en marcha en los tres estados del PNW, con avances tempranos reportados en Oregon (5%), Washington (1%) e Idaho (1%). La cosecha de primavera está completamente espigada en Oregon y Washington, e Idaho tiene el 80%. En Washington, solo se han iniciado cortes tempranos limitados, ya que las temperaturas nocturnas más frías están retrasando la maduración en las zonas de mayor altitud. En general, se

espera que la cosecha se acelere durante la próxima semana a medida que avance la maduración de la cosecha y las condiciones climáticas se mantengan favorables.

Condiciones del cultivo: Las condiciones de SW se mantienen estables, con un 60% de la cosecha de invierno calificada como buena a excelente y un 64% de la cosecha de primavera. Los representantes estatales de Washington e Idaho reportan buenas condiciones en general. Los resultados de la cosecha temprana en Oregon indican un buen potencial de rendimiento, peso específico elevado y niveles de proteína favorables.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: Las condiciones climáticas tienden a un patrón cálido y seco en toda la región.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	449	400	9.3	9.9	11.2	0.4	37.8	317
Prom. 5 años	421	400	9.0	10.2	11.5	0.5	33.6	336

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	61.2	80.5	0.1	0.0	0.6	0.7
1 SW	60.7	79.8	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: El cultivo de HRS de EE. UU. tiene un 55% espigado, con un rápido desarrollo bajo condiciones cálidas. South Dakota lidera con un 91%, seguida de Minnesota con un 65%, North Dakota con un 53% y Montana con un 28%.

Condiciones del cultivo: Las condiciones del cultivo de HRS siguen siendo generalmente favorables, pero cada vez más variables, con una ligera disminución en las calificaciones del USDA, del 59% al 57% de bueno a excelente. North Dakota muestra un fuerte potencial de rendimiento, aunque los extremos de humedad localizados están generando variabilidad. Las condiciones en Minnesota siguen siendo favorables, gracias a las lluvias oportunas. Por el contrario, South Dakota enfrenta un menor potencial de rendimiento y un mayor riesgo de abandono. En toda la región, la variabilidad está aumentando debido a la humedad desigual y al estrés previo, con expectativas generales de rendimiento cercanas al promedio.

Presión por enfermedades/plaga: La presión de enfermedades sigue siendo limitada, pero podría aumentar con las lluvias recientes y el aumento de la humedad ambiental.

Clima: Las temperaturas más altas y la mayor humedad, junto con tormentas aisladas, están aumentando la variabilidad, aunque se esperan condiciones más secas en algunas áreas.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386

FACTOR DE GRADOS

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: El 29% de la cosecha de Northern Durum ha espigado, con un rápido avance en North Dakota y Montana, aunque el desarrollo sigue retrasado con respecto al año pasado.

Condiciones del cultivo: Las condiciones para el Northern Durum empeoraron drásticamente, con solo un 25% calificado como bueno a excelente, frente al 46% de la semana pasada. Esta disminución se debe principalmente a North Dakota, donde las calificaciones cayeron significativamente debido a la sequía y el estrés ambiental previos. Las condiciones en

Montana también reflejan los desafíos de principios de temporada, que siguen limitando el potencial de rendimiento. En general, la variabilidad sigue siendo alta y persisten los riesgos de rendimiento en las zonas afectadas.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes de enfermedades o plagas, aunque los productores están monitoreando la situación debido al aumento de la humedad.

Clima: El clima sigue siendo variable, con lluvias dispersas que benefician a algunas zonas, mientras que otras permanecen secas; se espera un patrón más cálido y seco.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	lb/bu	kg/hl					
1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86


Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.

Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Abreviaturas de tablas

- Protein = proteína en base a 12% de humedad
- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- FM = material extraño
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)

- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Harvest Updates (Texas Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)