


Informe Semanal de la Cosecha – 10 junio, 2026

La cosecha de trigo de invierno ya está en marcha; el avance del HRW se ha visto ralentizado por las frecuentes lluvias en las Planicies del Sur y del Centro, mientras que la cosecha de SRW está avanzando en los estados del sur. Las recientes lluvias han ayudado a estabilizar las condiciones del trigo de primavera y el durum en las Planicies del Norte, aunque el grado de los cultivos sigue siendo mixto y se necesitará más humedad en las zonas más secas. Las condiciones del SW en el Noroeste Pacífico siguen siendo mayoritariamente favorables a medida que el trigo de invierno avanza hacia la madurez.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

Progreso de la cosecha: Según el USDA, el 85% de la cosecha de HRW ha espigado y el 8% se ha cultivado, cifras superiores al promedio. El USDA también informa que el avance de la cosecha en Texas es de 35% y de 5% en Kansas. En Oklahoma, los representantes del sector estiman que la cosecha tiene un 60% de avance y avanza hacia el norte. Las lluvias frecuentes siguen ralentizando la actividad en Texas, Oklahoma y Kansas. En las Planicies Altas, se espera que la cosecha en Wyoming comience aproximadamente tres semanas antes de lo normal.

Condiciones del cultivo: Las condiciones siguen siendo variables en toda la región de HRW, con rendimientos y calidad variables. Algunas zonas están experimentando un clima favorable para la cosecha a medida que los campos se secan, pero las lluvias y tormentas, a veces severas, continúan en las Planicies del Sur y Centro. Kansas ha reportado tormentas severas con lluvia, alta humedad y ráfagas de viento de hasta 161 km/h (100 mph). También se reportaron tormentas en Wyoming, con lluvias adicionales en el noreste de Colorado.

En las Planicies Altas del Norte, el calor está afectando el cultivo de invierno en South Dakota y aumentando la preocupación por el posible abandono de los campos. Montana recibió lluvias recientemente, pero el cultivo se ha visto afectado por la latencia temprana, las heladas, la sequía prolongada y las amplias fluctuaciones de temperatura. El potencial de rendimiento se ha reducido, con expectativas iniciales cercanas a los 37 bu/acre (2.5 ton/ha), aunque el clima más fresco y la humedad recientes están ayudando a estabilizar el cultivo.

Datos de trigo: El laboratorio ha recibido 36 muestras de HRW hasta la fecha. Los primeros promedios muestran un contenido de proteína del 12.8% (12% bh) y un peso específico ligeramente arriba de 60 lb/bu (78.9 kg/hl). Estos valores son preliminares debido al tamaño limitado de la muestra.

Presión por enfermedades/plagas: Se reporta germinación y bajo peso específico en áreas con fuertes lluvias.

Clima: Las recientes lluvias y tormentas han aliviado la sequía en algunas partes de las Planicies. Se pronostica calor continuo con probabilidad de tormentas dispersas.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370	1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362	1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Progreso de la cosecha: La actividad de cosecha de SRW se ha expandido en la parte sur de la región, con aproximadamente el 13% de avance. Más al norte, los campos están madurando y cambiando de color, y los preparativos para el cultivo están en marcha. En Ohio, las recientes condiciones cálidas han acelerado la madurez y se espera que la cosecha comience dentro de los próximos 10 a 14 días.

Condiciones del cultivo: Las condiciones generales de los cultivos de SRW siguen siendo favorables en toda la región. En Ohio, los productores informan que las lluvias recientes apoyaron el desarrollo de los cultivos a pesar del calor reciente, y las expectativas de rendimiento siguen siendo positivas. Las condiciones también son favorables en gran parte de las zonas central y oriental, donde la humedad primaveral ha sido adecuada, aunque la sequía sigue siendo una preocupación en áreas fuera del Medio Oeste. No se han reportado problemas de calidad generalizados.

Presión por enfermedades/plagas: No se han reportado problemas importantes de enfermedades o plagas.

Clima: Persisten condiciones cálidas y húmedas en toda la región de SRW, con lluvias dispersas que generan una distribución irregular de humedad. Las condiciones de sequía persisten en gran parte de la región en crecimiento fuera del Medio Oeste, y se espera un calor continuo con posibilidades periódicas de tormentas.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301	2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316	2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. Fuente: Great Plains Analytical Laboratory

SOFT WHITE

Progreso de la cosecha: El desarrollo del trigo de invierno está adelantado en Washington, Oregon e Idaho. Oregon ha espigado un 97%, Washington un 85% e Idaho un 75%. La siembra de trigo de primavera ha finalizado y la madurez de los cultivos, en general, está dentro del plazo previsto o ligeramente adelantada con respecto al promedio. La cosecha inicial se mantiene según lo programado para finales de junio o principios de julio si las condiciones siguen siendo favorables.

Condiciones del cultivo: En general, las condiciones de SW siguen siendo mayoritariamente favorables, con un 70% del total de la cosecha calificada como buena a excelente al 8 de junio. El trigo de invierno se califica bueno a excelente en un 69% en promedio, con Idaho a la cabeza con un 82% y Washington con un 75%, mientras que Oregon se mantiene en un 50%. El trigo de primavera se califica bueno a excelente en un 71% en general, con Washington en un 67% e Idaho en un 75%. Se está desarrollando cierta sequía localizada en algunas zonas de Oregon y el sur de Idaho, pero no se han reportado problemas generalizados de estrés en los cultivos ni de calidad.

Presión por enfermedades/plagas: Los agricultores de Idaho están reportando roya amarilla y evaluando focos de daños por heladas.

Clima: Las condiciones han sido variables, con temperaturas más frescas y chubascos dispersos, seguidos de un clima más cálido y seco. Se espera que continúen las temperaturas cálidas con escasas precipitaciones en toda la región.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO						
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl				
2025 Final	449	400	9.3	9.9	11.2	0.4	37.8	317	1 SW	61.2	80.5	0.1	0.0	0.6	0.7
Prom. 5 años	421	400	9.0	10.2	11.5	0.5	33.6	336	1 SW	60.7	79.8	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. Fuente: Wheat Marketing Center

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: La siembra de trigo de primavera ha finalizado en toda la región de HRS, y el cultivo ha emergido en un 89%. Por estado, la emergencia es del 98% en South Dakota, 93% en Minnesota, 85% en North Dakota y 81% en Montana. Todos los estados superan el promedio de los últimos 5 años, excepto Montana, que se encuentra al mismo nivel que el promedio. Se espera que la cosecha comience en South Dakota durante la primera semana de julio.

Condiciones del cultivo: Las condiciones siguen siendo variables en toda la región de HRS, pero las recientes lluvias han sido beneficiosas en varias zonas. Minnesota continúa mostrando las mejores condiciones de cultivo, con un 86% calificado bueno a excelente, seguido de North Dakota con un 61% y South Dakota con un 52%. Montana sigue siendo el estado más afectado, con solo un 10% calificado bueno a excelente, aunque las condiciones han mejorado en los últimos 7 a 10 días tras recibir la tan necesaria humedad.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas por enfermedades ni plagas.

Clima: El calor reciente en las Dakotas ha disminuido, con temperaturas más frescas y lluvias dispersas, mientras que Montana recibió humedad beneficiosa y Minnesota continúa experimentando lluvias periódicas.

DATOS DEL TRIGO									FACTOR DE GRADOS							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404	1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386	1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.

Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: La siembra de trigo durum ha finalizado en el este de Montana y el oeste de North Dakota. Los cultivos ya han emergido y se encuentran en la fase inicial de desarrollo. La emergencia es del 66% en North Dakota, ligeramente superior al promedio del 65%, y del 76% en Montana, superior al promedio del 68 %. Las condiciones previas de sequía ralentizaron el desarrollo inicial, pero las recientes lluvias han contribuido al progreso del cultivo a mediados de junio.

Condiciones del cultivo: Las condiciones para el trigo durum siguen siendo difíciles, pero han mejorado tras las lluvias necesarias. En North Dakota, las lluvias recientes han ayudado a aliviar el estrés, aunque las calificaciones aún reflejan el difícil comienzo, con un 35% del cultivo calificado bueno a excelente, en comparación con el 60% del año pasado. Las calificaciones de las condiciones en Montana aún no están disponibles, pero los representantes estatales indican que el cultivo está más estresado en general, a pesar de cierta mejoría en las áreas donde hubo lluvias recientes. Se necesitarán más lluvias para apoyar el desarrollo continuo.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas por enfermedades ni plagas.

Clima: Tras la ola de calor reciente, se dio paso a temperaturas más frescas y lluvias generalizadas en gran parte de la región del durum, lo que proporcionó un alivio oportuno a los campos que antes estaban secos.

DATOS DEL TRIGO									FACTORES DE GRADO							
	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	Analizadas	Esperadas								lb/bu	kg/hl					
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325	1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427	1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86


Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.

Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Abreviaturas de tablas

- Protein = proteína en base a 12% de humedad
- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- FM = material extraño
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- [Resources \(California Wheat\)](#)
- [News \(Colorado Wheat\)](#)
- [News \(Idaho Wheat\)](#)
- [Harvest Reports \(Kansas Wheat\)](#)
- [News \(Maryland Grain Producers\)](#)
- [News \(South Dakota Wheat\)](#)
- [Harvest Updates \(Texas Wheat\)](#)
- [Weekly Wheat Update \(North Dakota Wheat Commission\)](#)
- [Harvest Reports \(Oklahoma Wheat\)](#)
- [News \(Ohio Corn & Wheat\)](#)
- [News \(Oregon Wheat\)](#)
- [News \(Washington Grains\)](#)
- [Harvest Reports \(Plains Grains\)](#)
- [Weekly Harvest Reports \(Wheat Marketing Center\)](#)