


Informe Semanal de la Cosecha – 15 julio, 2026

La cosecha de trigo en EE. UU. continúa avanzando. La cosecha de invierno se desplaza hacia el norte y los cultivos de primavera están en la etapa de llenado del grano. El pronóstico de producción de julio del USDA proyecta la cosecha de trigo más pequeña de EE. UU. desde 1970/71, debido principalmente a una menor producción de trigo de invierno, mientras que se espera que la producción de trigo de primavera se mantenga cerca de los niveles del año pasado. Una cúpula de calor en las regiones de cultivo del norte está acelerando el desarrollo de los cultivos y el progreso de la cosecha. El Wheat Quality Council Hard Red Spring and Durum Tour del 2026 comienza la próxima semana. Siga #wheattour26 para obtener actualizaciones desde el campo.

Porcentaje estimado de la cosecha muestreada a la fecha
(fuentes: industria triguera y reporte de progreso de la cosecha de NASS)



HARD RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de HRW ha finalizado en Texas, Oklahoma y Kansas, y continúa avanzando hacia el norte, con un 74% de la cosecha ya recolectada. El calor está acelerando el secado y debería ayudar a finalizar la cosecha en Colorado y Wyoming esta semana. En los demás estados productores, la cosecha tiene entre el 4% y 42% de avance. Los representantes de Wyoming esperan que la cosecha alcance el 75% de avance para finales de semana, entre dos y tres semanas antes del promedio. El USDA estima la producción de HRW en 471 millones de bu (12.8 MTM), un 5% menos que el mes pasado.

Condiciones del cultivo: La sequía y las heladas redujeron los rendimientos en algunas zonas de las Planicies, lo que contribuyó a una menor cosecha de HRW. En Colorado, la calidad se mantiene mejor que los rendimientos, con un peso específico promedio cercano a 59 lb/bu (77.6 kg/hl) y un contenido proteico cercano al 12.5% (12% bh). Se prevé que Colorado produzca su cosecha más pequeña desde 1965. El USDA NASS estima que la producción de Nebraska será un 57% inferior a la del año pasado y la más pequeña del estado desde 1917. En Montana, los productores esperan comenzar la cosecha en un plazo de 7 a 10 días y evaluarán cualquier impacto residual de las heladas. En el Noroeste Pacífico (PNW), la cosecha se está adelantando ligeramente al promedio y los primeros informes de calidad son positivos.

Datos de trigo: Hay 407 muestras en el laboratorio para su análisis. Los promedios actuales sin ponderar son: peso específico de 60.0 lb/bu (78.9 kg/hl), humedad del 11.3%, peso de 1000 granos de 28.2 gramos, proteína del 12.5% (12% bh) y *falling number* de 354 segundos. La cosecha actualmente tiene grado U.S. No. 2 HRW.

Clima: Predominan las condiciones cálidas y secas en gran parte de la región HRW, desde las Planicies del sur y centro hasta las zonas de producción del norte.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	*Dockage* %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	407	600	11.3	12.5	14.2	0.4	28.2	354
Semana Pasada	348	600	11.5	12.4	14.0	0.4	28.4	353

FACTORES DE GRADO

	Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
		lb/bu	kg/hl				
Esta Semana	2 HRW	60.0	78.9	0.1	0.3	1.0	1.4
Semana Pasada	2 HRW	60.3	79.3	0.1	0.5	1.0	1.6

2025 Final	566	500	11.5	12.1	13.7	0.5	30.1	370	1 HRW	60.0	79.0	0.1	0.1	0.8	0.9
Prom. 5 años	538	500	10.9	12.3	13.9	0.5	30.7	362	1 HRW	61.0	80.2	0.1	0.3	1.0	1.4

Nota: Los promedios de HRW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: CO, ID, KS, MT, NE, OK, OR, SD, TX, WA, WY.
Fuente: Plains Grains, Inc.

SOFT RED WINTER

Progreso de la cosecha: La cosecha de SRW está llegando a su fin y tiene un 90% de avance, superando las cifras del año pasado y el promedio de los últimos cinco años. La cosecha está finalizando en Ohio, Illinois e Indiana tras retrasos intermitentes por lluvias. El USDA estima la producción de SRW en 287 millones de bushels (7.8 MTM), un 4% menos que el estimado en junio.

Condiciones del cultivo: Representantes estatales en Ohio informan sobre una cosecha húmeda que afectó el peso específico y el *falling numer* en algunas zonas. Una helada tardía en primavera también redujo los rendimientos en algunas partes del estado, aunque los productores en otras áreas reportan buenos rendimientos.

Datos de trigo: Se han completado las pruebas de 156 muestras de toda la región. Los promedios actuales sin ponderar incluyen una humedad del 13.2%, una proteína del 10.1% (12% bh), un peso de mil granos de 34.3 gramos y un *falling numer* de 308 segundos. En comparación con 2025, la proteína, el peso de mil granos y el *falling number* son mayores. El peso específico de 59.9 lb/bu (78.8 kg/hl) es ligeramente superior al del año pasado, lo que hace el promedio de grado U.S. No. 2 SRW. De las muestras analizadas hasta el momento para determinar el nivel de vomitoxinas (DON), solo una presenta resultados ligeramente superiores a 1 ppm.

Datos de harina: Los primeros datos de la harina sugieren que el rendimiento promedio de molienda en laboratorio es del 70.6%, en comparación con el 69.5% del año pasado. El promedio de proteína de la harina es del 8.9% y el promedio de gluten húmedo es del 24.6%. La absorción actual del farinógrafo es del 54.4%, en comparación con el 53.0% del año pasado.

Clima: Fue otra semana de clima inestable, con tormentas que afectaron gran parte de la región la semana pasada. Se espera que persistan las condiciones cálidas y húmedas.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
Esta Semana	156	250	13.2	10.1	11.5	0.4	34.3	308
Semana Pasada	127	250	13.0	10.2	11.6	0.6	33.9	307
2025 Final	219	250	12.8	9.3	10.5	0.5	32.9	301
Prom. 5 años	235	250	13.1	9.5	10.8	0.3	34.0	316

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
2 SRW	59.9	78.8	0.2	0.6	0.7	1.5
2 SRW	60.1	79.1	0.3	0.4	0.6	1.3
2 SRW	59.0	77.7	0.2	1.2	0.9	2.3
2 SRW	59.8	78.7	0.1	0.3	0.6	1.0

Nota: Los promedios de SRW en el informe de cosecha semanal son promedios simples de todas las muestras analizadas y no han sido ponderados por la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: AL, AR, IL, IN, KY, MD, MO, NC, OH, TN, VA. *Fuente: Great Plains Analytical Laboratory*

SOFT WHITE

Progreso de la cosecha: La cosecha está en marcha en los tres estados del PNW, con el 5% de la cosecha de SW ya recolectada. Se están tomando las primeras muestras y se esperan los datos iniciales de calidad de la cosecha en las próximas 1 a 2 semanas. El USDA estima la producción de trigo blanco de invierno en 232 millones de bushels (6.3 MTM), una ligera disminución con respecto al mes pasado. En Idaho, la cosecha comenzó aproximadamente dos semanas antes del promedio y se espera que se acelere durante los próximos 10 a 14 días.

Condiciones del cultivo: El 62% de la cosecha de SW se considera de buena a excelente. Los representantes estatales informan que tanto la cosecha de invierno como la de primavera de SW tienen buen aspecto, con rendimientos promedio o ligeramente superiores al promedio. Si bien los productores continúan monitoreando los posibles impactos de las heladas tardías, los primeros informes indican buena calidad y una variedad de niveles de proteína. Se espera que el calor de esta semana acelere el desarrollo final de los cultivos y el progreso de la cosecha.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes por enfermedades ni plagas.

Clima: El clima cálido continúa en el noroeste del Pacífico, mientras que el desarrollo de los cultivos y el progreso de la cosecha se aceleran.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	449	400	9.3	9.9	11.2	0.4	37.8	317
Prom. 5 años	421	400	9.0	10.2	11.5	0.5	33.6	336

FACTORES DE GRADO

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %
	lb/bu	kg/hl				
1 SW	61.2	80.5	0.1	0.0	0.6	0.7
1 SW	60.7	79.8	0.1	0.0	0.6	0.7

Nota: Los promedios de SW no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ID, OR, WA. *Fuente: Wheat Marketing Center*

HARD RED SPRING

Progreso de la cosecha: Más del 70% de la cosecha de HRS ha espigado, incluyendo el 97% en South Dakota, el 78% en North Dakota y Minnesota, y el 41% en Montana. Los productores de South Dakota están entre 7 y 10 días de iniciar la cosecha. El USDA estima la producción de HRS en 436 millones de bushels (11.9 MTM), un 5% menos que el año pasado. A pesar de la menor producción, el potencial de rendimiento se mantiene relativamente alto, aunque las condiciones climáticas durante el llenado del grano siguen siendo importantes. El Wheat Quality Council Hard Red Spring and Durum Tour del 2026 comienza la próxima semana. Para obtener actualizaciones, siga #wheattour26 en las redes sociales.

Condiciones del cultivo: La cosecha de HRS en EE. UU. se califica como buena a excelente en un 59%. Las recientes lluvias de 7.6 a 12.7 cm en el noreste de Montana mejoraron la humedad del suelo y beneficiaron la cosecha. Se espera que gran parte de la región de cultivo experimente una ola de calor esta semana mientras el cultivo avanza en el llenado del grano. El calor puede aumentar el estrés de la cosecha en las zonas más secas, particularmente donde persisten las condiciones de sequía. El USDA estima que el 19% de la cosecha de HRS aún se encuentra en sequía.

Presión por enfermedades/plaga: La presión de enfermedades sigue siendo limitada, pero podría aumentar con las lluvias recientes y el aumento de la humedad ambiental.

Clima: Una ola de calor traerá condiciones cálidas y secas a toda la región de HRS esta semana, con temperaturas que podrían superar los 38 °C en algunas zonas.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de mil Granos g	FNs
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	448	450	12.2	14.4	16.3	0.6	33.9	404
Prom. 5 años	452	450	11.9	14.5	16.4	0.6	31.5	386

FACTOR DE GRADOS

Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	DHV %
	lb/bu	kg/hl					
1 NS	61.6	81.0	0.0	0.3	0.5	0.9	62
1 NS	61.5	80.9	0.0	0.3	0.9	1.2	69

Nota: Los promedios de HRS no están ponderados para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: MN, MT, ND, SD.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Hard Red Spring de North Dakota State University.

NORTHERN DURUM

Progreso de la cosecha: La cosecha de durum de North Dakota tiene 65% espigado, por debajo del año pasado pero cerca del promedio de los últimos 5 años, mientras que Montana tiene 22% espigado, por debajo tanto del año pasado como del promedio. El USDA estima la producción de trigo durum en 70.9 millones de bushels (1.9 MTM), un 18% menos que el año pasado.

Condiciones del cultivo: La cosecha de durum de North Dakota califica como buena a excelente en un 83%, mientras que la de Montana se califica como buena a excelente en un 13%. Las recientes lluvias mejoraron la humedad del suelo y beneficiaron a los cultivos en ambos estados, particularmente en Montana, donde la sequía afectó la cosecha a principios de la temporada. La humedad adicional debería favorecer el desarrollo, aunque el calor previsto para esta semana podría aumentar el estrés de la cosecha a medida que avanza la maduración.

Presión por enfermedades/plaga: No se han reportado problemas importantes de enfermedades o plagas, aunque los productores están monitoreando la situación debido al aumento de la humedad.
Clima: Las condiciones siguen siendo cálidas y secas en gran parte de la zona de cultivo, lo que acelera el desarrollo de la cosecha.

DATOS DEL TRIGO

	Muestras		Humedad %	Proteína %	Proteína Base Seca %	Dockage %	Peso de Mil Granos g	FN s
	Analizadas	Esperadas						
2025 Final	136	130	11.6	14.2	16.2	0.6	43.6	325
Prom. 5 años	127	123	11.2	14.2	16.2	0.9	40.9	427

FACTORES DE GRADO


Grado	Peso Específico		Materia Extraña %	Daño Total %	Encogidos y quebrados %	Defectos %	HVAC %
	lb/bu	kg/hl					
1 HAD	61.9	80.6	0.0	1.8	0.5	2.3	84
1 HAD	61.3	79.8	0.0	0.4	0.8	1.2	86

Nota: Los promedios de trigo durum del norte en el informe de cosecha semanal no se ponderan para la producción. Los resultados mostrados representan muestras analizadas recolectadas hasta la fecha. Los datos y comentarios se refieren únicamente a los siguientes estados muestreados: ND, MT.
Fuente: Laboratorio de Calidad de Trigo Durum de North Dakota State University.

Abreviaturas de tablas

- Protein = proteína en base a 12% de humedad
- TKW = peso de mil granos
- FN = falling number (índice de caída)
- FM = material extraño
- S&B = granos quebrados y encogidos
- n/a = no disponible

Regiones productoras de trigo de EE. UU. (solo para estados que hacen muestreos de calidad de la cosecha)



Recursos adicionales

- Resources (California Wheat)
- News (Colorado Wheat)
- News (Idaho Wheat)
- Harvest Reports (Kansas Wheat)
- News (Maryland Grain Producers)
- News (South Dakota Wheat)
- Weekly Wheat Update (North Dakota Wheat Commission)
- Harvest Reports (Oklahoma Wheat)
- News (Ohio Corn & Wheat)
- News (Oregon Wheat)
- News (Washington Grains)
- Harvest Reports (Plains Grains)

- Harvest Updates (Texas Wheat)
- Weekly Harvest Reports (Wheat Marketing Center)